

Metronidazole
Statut de médicament essentiel
Description générale

INN
Metronidazole
Codes ATC
[A01AB17 P01AB01 J01XD01](#)

Type de médicament
Chemical agent
Groupes d'antibiotiques

[ACCESS](#)

Historique des statuts LME

Ajouté pour la première fois en 1977 ([TRS 615](#)) pour [Amoebiasis](#)

Ajouté en 1979 ([TRS 641](#)) pour [Bacterial infection of unspecified site](#)

Retiré en 2017 ([TRS 1006](#)) pour [Bacterial infection of unspecified site](#)

Ajouté en 2017 ([TRS 1006](#)) pour [Intestinal infections due to Clostridioides difficile](#)

Ajouté en 2017 ([TRS 1006](#)) pour [Trichomoniasis](#)

Ajouté en 2021 ([TRS 1035](#)) pour [Necrotising fasciitis](#)

Ajouté en 2023 ([TRS 1049](#)) pour [Peritonitis](#)

Ajouté en 2023 ([TRS 1049](#)) pour [Peritoneal abscess](#)

Ajouté en 2023 ([TRS 1049](#)) pour [Other specified prophylactic measures](#)

Wikipédia

[Metronidazole](#)

DrugBank

[Metronidazole](#)

Recommandations

Section

Access group antibiotics

- Oral > Liquid: 200 mg per 5 mL (as benzoate)
- Oral > Solid: 200 to 500 mg tablet
- Parenteral > General injections > unspecified: 500 mg per 100 mL in vial Injection
- Local > Rectal > Suppository: 500 mg; 1 g
- Parenteral > General injections > unspecified: 500 mg per 100 mL in vial
- Oral > Solid > tablet: 500 mg; 200 mg; 250 mg; 400 mg
- Oral > Solid > tablet: 200 mg; 250 mg; 400 mg; 500 mg

Indications

Premier choix

[Intestinal infections due to Clostridioides difficile](#) [Trichomoniasis](#) [Necrotising fasciitis](#)

Autres indications

[Bacterial infection of unspecified site](#)

Section

Antiamoebic and anti giardiasis medicines

- Oral > Liquid: 200 mg per 5 mL (as benzoate)
- Parenteral > General injections > unspecified: 500 mg in 100 mL vial
- Oral > Solid > tablet: 200 mg; 250 mg; 400 mg; 500 mg

Indications

[Amoebiasis](#)