

Description générale

INN	Metronidazole
Codes ATC	A01AB17 P01AB01 J01XD01
Type de médicament	Chemical agent
Groupes d'antibiotiques	A ACCESS
Historique des statuts LME	Ajouté pour la première fois en 1977 (TRS 615) pour Amoebiasis Ajouté en 1979 (TRS 641) pour Bacterial infection of unspecified site Ajouté en 2017 (TRS 1006) pour Peritoneal abscess Ajouté en 2017 (TRS 1006) pour Peritonitis Retiré en 2017 (TRS 1006) pour Bacterial infection of unspecified site Ajouté en 2017 (TRS 1006) pour Intestinal infections due to Clostridioides difficile Ajouté en 2017 (TRS 1006) pour Trichomoniasis Ajouté en 2019 (TRS 1021) pour Other specified prophylactic measures Ajouté en 2021 (TRS 1035) pour Necrotising fasciitis
Wikipédia	Metronidazole 
DrugBank	Metronidazole 

Recommandations

Section Access group antibiotics

Oral > Liquid: 200 mg per 5 mL (as benzoate)
Oral > Solid: 200 to 500 mg tablet
Parenteral > General injections > unspecified: 500 mg per 100 mL in vial Injection
Local > Rectal > Suppository: 500 mg suppository; 1 g suppository
Oral > Solid > tablet: 200 mg; 250 mg; 400 mg; 500 mg
Local > Rectal > Suppository: 1 g suppository; 500 mg suppository

Indications

Premier choix

- Intestinal infections due to Clostridioides difficile
- Trichomoniasis

co-prescrire avec [cefazolin](#)

- Other specified prophylactic measures

co-prescrire avec [cefotaxime](#)

- Peritonitis (mild-moderate)

co-prescrire avec [cefotaxime](#)

Peritoneal abscess (severe)

co-prescrire avec [cefotaxime](#)

Peritoneal abscess (mild-moderate)

co-prescrire avec [cefotaxime](#)

Peritonitis (severe)

co-prescrire avec [ceftriaxone](#)

Necrotising fasciitis

co-prescrire avec [ceftriaxone](#)

Peritonitis (mild-moderate)

co-prescrire avec [ceftriaxone](#)

Peritonitis (severe)

co-prescrire avec [ceftriaxone](#)

Peritoneal abscess (mild-moderate)

co-prescrire avec [ceftriaxone](#)

Peritoneal abscess (severe)

Second choix

co-prescrire avec [ciprofloxacin](#)

Peritoneal abscess (mild-moderate)

co-prescrire avec [ciprofloxacin](#)

Peritonitis (mild-moderate)

Autres indications

Bacterial infection of unspecified site

Section **Antiamoebic and anti giardiasis medicines**

Oral > Liquid: 200 mg per 5 mL (as benzoate)

Parenteral > General injections > unspecified: 500 mg in 100 mL vial

Oral > Solid > tablet: 200 mg; 250 mg; 400 mg; 500 mg

Indications

Amoebiasis

