

Doxorubicin

Statut de médicament essentiel

Description générale

Doxorubicin is an anthracycline antineoplastic agent, used in treatment protocols for various cancers.

INN

Doxorubicin

Codes ATC

[L01DB01](#) [L01AA01](#)

Type de médicament

Chemical agent

Historique des statuts LME

Ajouté pour la première fois en 1977 ([TRS 615](#)) pour [Unspecified malignant neoplasms of ill-defined or unspecified sites](#)

Ajouté en 2011 ([TRS 965](#)) pour [Lymphoid leukaemia, not elsewhere classified](#)

Ajouté en 2011 ([TRS 965](#)) pour [Burkitt lymphoma including Burkitt leukaemia](#)

Ajouté en 2015 ([TRS 994](#)) pour [Malignant neoplasms of breast](#)

Ajouté en 2015 ([TRS 994](#)) pour [Follicular lymphoma](#)

Ajouté en 2015 ([TRS 994](#)) pour [Kaposi sarcoma of unspecified primary site](#)

Ajouté en 2015 ([TRS 994](#)) pour [Hodgkin lymphoma](#)

Ajouté en 2015 ([TRS 994](#)) pour [Diffuse large B-cell lymphoma, not otherwise specified](#)

Ajouté en 2015 ([TRS 994](#)) pour [Malignant neoplasms of kidney, except renal pelvis](#)

Ajouté en 2015 ([TRS 994](#)) pour [Ewing sarcoma of bone and articular cartilage of unspecified sites](#)

Ajouté en 2015 ([TRS 994](#)) pour [Osteosarcoma of bone and articular cartilage of unspecified sites](#)

Retiré en 2015 ([TRS 994](#)) pour [Unspecified malignant neoplasms of ill-defined or unspecified sites](#)

Ajouté en 2015 ([TRS 994](#)) pour [Other specified malignant neoplasms of breast](#)

Ajouté en 2019 ([TRS 1021](#)) pour [Plasma cell myeloma](#)

Demande refusée en 2021 ([TRS 1035](#)) pour [Rhabdomyosarcoma primary site](#)

Ajouté en 2023 ([TRS 1049](#)) pour [Anaplastic large cell lymphoma, ALK-positive](#)

Ajouté en 2023 ([TRS 1049](#)) pour [Anaplastic large cell lymphoma, ALK-negative](#)

Wikipédia

[Doxorubicin](#)

DrugBank

[Doxorubicin](#)

Recommandations

Section

Cytotoxic medicines

- Parenteral > General injections > IV: 10 mg in vial (hydrochloride) powder for injection; 50 mg in vial (hydrochloride) powder for injection; 2 mg per mL in 5 mL vial (hydrochloride); 2 mg per mL in 25 mL vial (hydrochloride)
- Parenteral > General injections > IV: 10 mg in vial (hydrochloride); 50 mg in vial (hydrochloride)

Indications

[Diffuse large B-cell lymphoma, not otherwise specified](#) [Malignant neoplasms of breast](#) [Hodgkin lymphoma](#) [Kaposi sarcoma of unspecified primary site](#) [Follicular lymphoma](#) [Unspecified malignant neoplasms of ill-defined or unspecified sites](#) [Osteosarcoma of bone and articular cartilage of unspecified sites](#) [Ewing sarcoma of bone and articular cartilage of unspecified sites](#) [Lymphoid leukaemia, not elsewhere classified](#) [Malignant neoplasms of kidney, except renal pelvis](#) [Burkitt lymphoma including Burkitt leukaemia](#) [Other specified malignant neoplasms of breast](#) [Plasma cell myeloma](#) [Rhabdomyosarcoma primary site](#) [Anaplastic large cell lymphoma, ALK-positive](#) [Anaplastic large cell lymphoma, ALK-negative](#)