

Metronidazole

Section

Access group antibiotics

Oral > Liquid: 200 mg per 5 mL (as benzoate)

Oral > Solid: 200 to 500 mg tablet

Parenteral > General injections > unspecified: 500 mg per 100 mL in vial

Injection

Local > Rectal > Suppository: 500 mg suppository; 1 g suppository

Indications

Premier choix

co-prescrire avec cefazolin

Other specified prophylactic measures

co-prescrire avec cefotaxime

Peritoneal abscess (severe)

co-prescrire avec cefotaxime

Peritonitis (severe)

co-prescrire avec cefotaxime

Peritonitis (mild-moderate)

co-prescrire avec cefotaxime

Peritoneal abscess (mild-moderate)

co-prescrire avec ceftriaxone

Peritoneal abscess (severe)

co-prescrire avec ceftriaxone

Peritoneal abscess (mild-moderate)

co-prescrire avec ceftriaxone

Peritonitis (severe)

co-prescrire avec ceftriaxone

Peritonitis (mild-moderate)

Second choix

co-prescrire avec ciprofloxacin

Peritoneal abscess (mild-moderate)

co-prescrire avec ciprofloxacin

Peritonitis (mild-moderate)

Autres indications

Bacterial infection of unspecified site

Amoebiasis

Antiamoebic and anti giardiasis medicines

Oral > Liquid: 200 mg per 5 mL (as benzoate)

Parenteral > General injections > unspecified: 500 mg in 100 mL vial

Oral > Solid > tablet: 200 mg; 250 mg; 400 mg; 500 mg