

[Aprepitant](#)

Statut de médicament essentiel

Section:

[17. Gastrointestinal medicines](#) [17.2. Antiemetic medicines](#)

Codes ATC: [A04AD12](#)

EMLc

Indication

Nausea or vomiting Code ICD11: [MG10](#)

INN

Aprepitant

Type de médicament

Chemical agent

Type de liste

Liste complémentaire

Formulations

Oral > Liquid: 125 mg powder for oral suspension (in sachet)

Oral > Solid > capsule: 80 mg (EML) ; 125 mg (EML) ; 165 mg (EML)

Historique des statuts LME

Ajouté pour la première fois en 2019 ([TRS 1021](#))

Modifié en 2025 ([TRS 1064](#))

Sexe

Tous

Âge

Aussi recommandé pour les enfants

Équivalence thérapeutique

La recommandation concerne ce médicament spécifique

Renseignements sur le brevet

Main patents have expired but secondary patents might remain active in some jurisdictions. For more information on specific patents and license status for developing countries visit www.MedsPal.org

Lire la suite [sur les brevets](#).

Wikipédia

[Aprepitant](#)

DrugBank

[Aprepitant](#)

Résumé des preuves et recommandation du comité d'experts



Following the review of the age-appropriateness of formulations of essential medicines for children, the Expert Committee recommended the removal from the EMLc of aprepitant capsules (80 mg, 125 mg and 165 mg). These formulations cannot deliver the recommended dose of aprepitant for children aged below 12 years.