

## [Artemether](#)

Statut de médicament essentiel

Section:

[6. Anti-infective medicines 6.5. Antiprotozoal medicines 6.5.3. Antimalarial medicines 6.5.3.1. Antimalarial medicines > Medicines for curative treatment](#)

Codes ATC: [P01BE02](#)

EMLc

Indication

Malaria due to Plasmodium vivax Code ICD11: [1F81](#)

INN

Artemether

Type de médicament

Chemical agent

Type de liste

Liste de base

Additional notes

For use in the management of severe malaria

Formulations

**Parenteral > General injections > IM:** 20 mg per mL in 1 mL ampoule (oily injection) ; 40 mg per mL in 1 mL ampoule (oily injection)

Historique des statuts LME

Ajouté pour la première fois en 1997 ([TRS 882](#))

Modifié en 2002 ([TRS 914](#))

Modifié en 2007 ([TRS 946](#))

Modifié en 2007 ([TRS 950](#))

Modifié en 2025 ([TRS 1064](#))

Sexe

Tous

Âge

Aussi recommandé pour les enfants

Équivalence thérapeutique

La recommandation concerne ce médicament spécifique

Renseignements sur le brevet

Patents have expired in most jurisdictions

Lire la suite [sur les brevets.](#)

Wikipédia

[Artemether](#)

DrugBank

[Artemether](#)

Résumé des preuves et recommandation du comité d'experts



Following the review of the age-appropriateness of formulations of essential medicines for children, the Expert Committee recommended replacing the 80 mg/mL strength of artemether oily injection with 20 mg/mL and 40 mg/mL strengths. The 80 mg/mL strength has limited utility for children under 12 years of age.