

[Furosemide](#)

Statut de médicament essentiel

Section:

[12. Cardiovascular medicines 12.4. Medicines used in heart failure](#)

Codes ATC: [C03CA01](#)

EMLc

Indication

Heart failure Code ICD11: [BD0Z](#)

INN

Furosemide

Type de médicament

Chemical agent

Type de liste

Liste de base

Additional notes

The square box does not apply to the listing of furosemide on the EMLc

Formulations

Parenteral > General injections > IV: 10 mg per mL in 2 mL ampoule ; 10 mg per mL in 5 mL ampoule

Oral > Liquid: 20 mg per 5 mL (EMLc) ; 50 mg per 5 mL (EMLc)

Oral > Solid > tablet: 40 mg ; 20 mg

Historique des statuts LME

Ajouté pour la première fois en 2005 ([TRS 933](#))

Modifié en 2007 ([TRS 950](#))

Modifié en 2021 ([TRS 1035](#))

Modifié en 2023 ([TRS 1049](#))

Sexe

Tous

Âge

Aussi recommandé pour les enfants

Équivalence thérapeutique

[bumetanide](#) (Codes ATC: [C03CA02](#))

[torasemide](#) (Codes ATC: [C03CA04](#))

Renseignements sur le brevet

Patents have expired in most jurisdictions

Lire la suite [sur les brevets](#).

Wikipédia

[Furosemide](#)

DrugBank

[Furosemide](#)

Résumé des preuves et recommandation du comité d'experts

Following the review of the age-appropriateness of formulations on the EMLc, the Expert Committee recommended the addition of new strength formulations of furosemide (injection 10 mg/mL in 5 mL; tablet 20 mg (EML and EMLc); oral liquid 50 mg/5 mL (EMLc). The Committee also recommended the removal of furosemide 10 mg tablets from the EMLc.