

[Furosemide](#)

Statut de médicament essentiel

Section:

[16. Diuretics](#)

Codes ATC: [C03CA01](#)

EMLc

Indication

Oedema Code ICD11: [MG29.Z](#)

INN

Furosemide

Type de médicament

Chemical agent

Type de liste

Liste de base

Additional notes

The square box applies only to the listing of furosemide on the EML.

Formulations

Parenteral > General injections > IV: 10 mg per mL in 2 mL ampoule ; 10 mg per mL in 5 mL ampoule

Oral > Liquid: 20 mg per 5 mL (EMLc) ; 50 mg per 5 mL (EMLc)

Oral > Solid > tablet: 40 mg ; 20 mg

Historique des statuts LME

Ajouté pour la première fois en 1977 ([TRS 615](#))

Modifié en 1979 ([TRS 641](#))

Modifié en 2007 ([TRS 950](#))

Modifié en 2021 ([TRS 1035](#))

Modifié en 2023 ([TRS 1049](#))

Sexe

Tous

Âge

Aussi recommandé pour les enfants

Équivalence thérapeutique

[bumetanide](#) (Codes ATC: [C03CA02](#))

[torasemide](#) (Codes ATC: [C03CA04](#))

Renseignements sur le brevet

Patents have expired in most jurisdictions

Lire la suite [sur les brevets.](#)

Wikipédia

[Furosemide](#)

DrugBank

[Furosemide](#)

Résumé des preuves et recommandation du comité d'experts



Following the review of the age-appropriateness of formulations on the EMLc, the Expert Committee recommended the addition of new strength formulations of furosemide (injection 10 mg/mL in 5 mL; tablet 20 mg (EML and EMLc); oral liquid 50 mg/5 mL (EMLc). The Committee also recommended the removal of furosemide 10 mg tablets from the EMLc.