

[Ondansetron](#)

Statut de médicament essentiel

Section:

[17. Gastrointestinal medicines](#) [17.2. Antiemetic medicines](#)

Codes ATC: [A04AA01](#)

EMLc

Indication

Nausea or vomiting Code ICD11: [MG10](#)

INN

Ondansetron

Type de médicament

Chemical agent

Type de liste

Liste de base

Formulations

Parenteral > General injections > IV: 2 mg per mL in 2 mL ampoule (as hydrochloride dihydrate) ; 2 mg per mL in 4 mL ampoule

Oral > Liquid: 4 mg per 5 mL (as hydrochloride dihydrate)

Oral > Solid > dosage form: 4 mg (as hydrochloride dihydrate) ; 8 mg (as hydrochloride dihydrate) ; 24 mg (as hydrochloride dihydrate) (EML)

Historique des statuts LME

Ajouté pour la première fois en 2009 ([TRS 958](#))

Modifié en 2019 ([TRS 1021](#))

Modifié en 2021 ([TRS 1035](#))

Modifié en 2025 ([TRS 1064](#))

Sexe

Tous

Âge

Aussi recommandé pour les enfants

Limite d'âge

> 1 month

Équivalence thérapeutique

[dolasetron](#) (Codes ATC: [A04AA04](#))

[granisetron](#) (Codes ATC: [A04AA02](#))

[palonosetron](#) (Codes ATC: [A04AA05](#))

[tropisetron](#) (Codes ATC: [A04AA03](#))

Renseignements sur le brevet

Patents have expired in most jurisdictions

Lire la suite [sur les brevets](#).

Wikipédia

[Ondansetron](#)

DrugBank

[Ondansetron](#)

Résumé des preuves et recommandation du comité d'experts

Following the review of the age-appropriateness of formulations on the EMLc, the Expert Committee recommended: - the addition of ondansetron injection 2 mg/mL in 4 mL ampoule to the EML and EMLc; - to modify the formulation descriptions to better describe the available dosage forms.