

[Neostigmine](#)

Statut de médicament essentiel

Section:

[20. Muscle relaxants \(peripherally-acting\) and cholinesterase inhibitors](#)

Codes ATC: [N07AA01](#)

EMLc

Indication

Anticholinesterase reversible Code ICD11: [XM9D92](#)

INN

Neostigmine bromide

Type de médicament

Chemical agent

Type de liste

Liste de base

Formulations

Parenteral > General injections > unspecified: 0.5 mg per mL in 1 mL ampoule (neostigmine metilsulfate) ; 2.5 mg per mL in 1 mL ampoule (neostigmine metilsulfate)

Oral > Solid > tablet: 15 mg (neostigmine bromide) (EML)

Historique des statuts LME

Ajouté pour la première fois en 1977 ([TRS 615](#))

Modifié en 1979 ([TRS 641](#))

Modifié en 1989 ([TRS 796](#))

Modifié en 2003 ([TRS 920](#))

Modifié en 2007 ([TRS 950](#))

Modifié en 2025 ([TRS 1064](#))

Sexe

Tous

Âge

Aussi recommandé pour les enfants

Équivalence thérapeutique

La recommandation concerne ce médicament spécifique

Renseignements sur le brevet

Patents have expired in most jurisdictions

Lire la suite [sur les brevets.](#)

Wikipédia

[Neostigmine](#)

DrugBank

[Neostigmine](#)

Résumé des preuves et recommandation du comité d'experts

Following the review of the age-appropriateness of formulations on the EMLc, the Expert Committee recommended: - the deletion of neostigmine 15 mg tablets from the EMLc