

[Doxorubicin](#)

Statut de médicament essentiel

Section:

[8. Immunomodulators and antineoplastics](#) [8.2. Antineoplastics and supportive medicines](#) [8.2.1. Cytotoxic medicines](#)

Codes ATC: [L01DB01](#)

EMLc

Indication

Lymphoid leukaemia, not elsewhere classified Code ICD11: [2B33.3](#)

INN

Doxorubicin

Type de médicament

Chemical agent

Type de liste

Liste complémentaire

Formulations

Parenteral > General injections > IV: 10 mg in vial (hydrochloride) powder for injection ; 50 mg in vial (hydrochloride) powder for injection ; 2 mg per mL in 5 mL vial (hydrochloride) ; 2 mg per mL in 25 mL vial (hydrochloride)

Historique des statuts LME

Ajouté pour la première fois en 2011 ([TRS 965](#))

Modifié en 2015 ([TRS 994](#))

Modifié en 2023 ([TRS 1049](#))

Sexe

Tous

Âge

Aussi recommandé pour les enfants

Équivalence thérapeutique

La recommandation concerne ce médicament spécifique

Renseignements sur le brevet

Patents have expired in most jurisdictions

Lire la suite [sur les brevets](#).

Balises

Cancer

Wikipédia

[Doxorubicin](#)

DrugBank

[Doxorubicin](#)

Résumé des preuves et recommandation du comité d'experts

Following the review of the age-appropriateness of formulations on the EMLc, the Expert Committee recommended the inclusion of an additional dose forms of doxorubicin (2 mg/mL (hydrochloride) in 5 mL, 25 mL vial) to the EML and EMLc.