

## [Rifampicin](#)

Statut de médicament essentiel

Section:

[6. Anti-infective medicines 6.2. Antibacterials 6.2.4. Antileprosy medicines](#)

Codes ATC: [J04AB02](#)

EMLc

Indication

Leprosy Code ICD11: [1B50.Z](#)

INN

Rifampicin

Type de médicament

Chemical agent

Groupes d'antibiotiques

[WATCH](#)

Type de liste

Liste de base

Additional notes

Medicines for leprosy should be used in accordance with recommendations in WHO guidelines. Medicines used in the treatment of leprosy should never be used except in combination. Combination therapy is essential to prevent the emergence of drug resistance. Colour-coded blister packs (MDT blister packs) containing standard two-medicine (paucibacillary leprosy) or three-medicine (multibacillary leprosy) combination for adult and childhood leprosy should be used. MDT blister packs can be supplied free of charge through WHO.

Formulations

**Oral > Liquid:** 20 mg per mL (EMLc)

**Oral > Solid:** 150 mg ; 300 mg

Historique des statuts LME

Ajouté pour la première fois en 1977 ([TRS 615](#))

Modifié en 1982 ([TRS 685](#))

Modifié en 2003 ([TRS 920](#))

Modifié en 2007 ([TRS 950](#))

Modifié en 2023 ([TRS 1049](#))

Modifié en 2025 ([TRS 1064](#))

Sexe

Tous

Âge

Aussi recommandé pour les enfants

Équivalence thérapeutique

La recommandation concerne ce médicament spécifique

Renseignements sur le brevet

Patents have expired in most jurisdictions

Lire la suite [sur les brevets.](#)

Wikipédia

[Rifampicin](#)

DrugBank

[Rifampicin](#)

Résumé des preuves et recommandation du comité d'experts

Addition of a note stating medicines for leprosy should be used in accordance with recommendations in WHO guidelines.