

[Activated charcoal](#)

Statut de médicament essentiel

Section:

[4. Antidotes and other substances used in poisonings 4.1. Antidotes and other substances used in poisonings > Non-specific](#)

Codes ATC: [A07BA01](#)

EMLc

Indication

Unspecified injury, poisoning or certain other consequences of external causes Code ICD11: [NF2Z](#)

Type de médicament

Chemical agent

Type de liste

Liste de base

Additional notes

Alternative formulations of activated charcoal may be used if granules are not available.

Formulations

Oral > Liquid: 50 mg granules for oral suspension

Historique des statuts LME

Ajouté pour la première fois en 1977 ([TRS 615](#))

Modifié en 1979 ([TRS 641](#))

Modifié en 1987 ([TRS 770](#))

Modifié en 2003 ([TRS 920](#))

Modifié en 2007 ([TRS 950](#))

Modifié en 2025 ([TRS 1064](#))

Sexe

Tous

Âge

Aussi recommandé pour les enfants

Équivalence thérapeutique

La recommandation concerne ce médicament spécifique

Renseignements sur le brevet

Patents have expired in most jurisdictions

Lire la suite [sur les brevets](#).

Wikipédia

[Activated charcoal](#)

DrugBank

[Activated charcoal](#)

Résumé des preuves et recommandation du comité d'experts

Following the review of the age-appropriateness of formulations of essential medicines for children, the Expert Committee recommended changes to the listing of activated charcoal on the EML and EMLc, as follows: - addition of activated charcoal granules for oral suspension (50 mg) to replace the non-specific 'powder' formulation to provide more explicit formulation characteristics to facilitate procurement. - addition of a footnote stating that alternative formats may be used in an emergency if the granules for oral suspension are not available.