

[Cefalexin](#)

Statut de médicament essentiel

Section:

[6. Anti-infective medicines 6.2. Antibacterials 6.2.1. Access group antibiotics](#)

Codes ATC: [J01DB01](#)

EMLc

Indication

Acute pharyngitis Code ICD11: [CA02](#)

INN

Cefalexin

Type de médicament

Chemical agent

Groupes d'antibiotiques

[ACCESS](#)

Type de liste

Liste de base

Formulations

**Oral > Liquid:** 125 mg per 5 mL (anhydrous) powder for oral liquid ; 250 mg per 5 mL (anhydrous) powder for oral liquid

**Oral > Solid:** 250 mg (as monohydrate) ; 500 mg (as monohydrate) (EML)

**Oral > Solid > dispersible tablet:** 125 mg (EMLc) ; 250 mg (EMLc)

Historique des statuts LME

Ajouté pour la première fois en 2017 ([TRS 1006](#))

Modifié en 2021 ([TRS 1035](#))

Modifié en 2023 ([TRS 1049](#))

Sexe

Tous

Âge

Aussi recommandé pour les enfants

Équivalence thérapeutique

La recommandation concerne ce médicament spécifique

Renseignements sur le brevet

Patents have expired in most jurisdictions

Lire la suite [sur les brevets.](#)

Wikipédia

[Cefalexin](#)

DrugBank

[Cefalexin \(Cephalexin\)](#)

Recommandation du comité d'experts

Following the review of the age-appropriateness of formulations on the EMLc, the Expert Committee recommended: - the addition of new formulations of amoxicillin (dispersible, scored tablet, 250 mg and 500 mg) to the EMLc. - the addition of new formulations of cefalexin (dispersible tablet 125 mg and 250 mg) to the EMLc. - the addition of a new strength formulation of clarithromycin (solid oral dosage form 250 mg) to the EMLc. - the deletion of clarithromycin 500 mg solid oral dosage form from the EMLc.

Recommandations de la LME : Acute pharyngitis

Premier choix

Second choix

Watchful waiting, symptom relief and no antibiotic treatment should be considered as the first-line treatment option.

Premier choix

Second choix

Premier choix

[phenoxymethylpenicillin](#)

[amoxicillin](#)

Second choix

[cefalexin](#)

[clarithromycin](#)