

## [Phenytoin](#)

Statut de médicament essentiel

Section:

[5. Medicines for neurological disorders](#) [5.1. Medicines for central nervous system disorders](#) [5.1.1. Antiseizure medicines](#)

Codes ATC: [N03AB02](#)

EMLc

Indication

Epilepsy or seizures Code ICD11: [8A6Z](#)

INN

Phenytoin

Type de médicament

Chemical agent

Type de liste

Liste de base

Formulations

**Oral > Liquid:** 30 mg per 5 mL (phenytoin)

**Parenteral > General injections > unspecified:** 50 mg per mL in vial (phenytoin sodium)

**Oral > Solid > tablet:** 50 mg (phenytoin) (chewable)

**Oral > Solid > dosage form:** 25 mg (phenytoin sodium) ; 50 mg (phenytoin sodium) ; 100 mg (phenytoin sodium)

Historique des statuts LME

Ajouté pour la première fois en 1977 ([TRS 615](#))

Modifié en 1979 ([TRS 641](#))

Modifié en 1993 ([TRS 850](#))

Modifié en 2007 ([TRS 946](#))

Modifié en 2007 ([TRS 950](#))

Modifié en 2023 ([TRS 1049](#))

Sexe

Tous

Âge

Aussi recommandé pour les enfants

Équivalence thérapeutique

La recommandation concerne ce médicament spécifique

Renseignements sur le brevet

Patents have expired in most jurisdictions

Lire la suite [sur les brevets.](#)

Wikipédia

[Phenytoin](#)

DrugBank

[Phenytoin](#)

Résumé des preuves et recommandation du comité d'experts

Following the review of the age-appropriateness of formulations on the EMLc, the Expert Committee recommended: - deletion of phenytoin oral liquid 25 mg/5 mL (and associated note) from the EML and EMLc - the salt or free acid form of phenytoin be specified for each formulation type.