

## [Bupivacaine](#)

Statut de médicament essentiel

Section:

[1. Anaesthetics, preoperative medicines and medical gases](#) [1.2. Local anaesthetics](#)

Codes ATC: [N01BB01](#)

EMLc

Indication

Local anaesthetics Code ICD11: [XM7Y85](#)

INN

Bupivacaine

Type de médicament

Chemical agent

Type de liste

Liste de base

Formulations

**Parenteral > Locoregional injections > Spinal anaesthesia:** 0.5% in 4 mL ampoule (hydrochloride) + 8% glucose solution

**Parenteral > General injections > unspecified:** 0.25% (hydrochloride) ; 0.5% (hydrochloride)

Historique des statuts LME

Ajouté pour la première fois en 1977 ([TRS 615](#))

Modifié en 2007 ([TRS 950](#))

Modifié en 2021 ([TRS 1035](#))

Modifié en 2025 ([TRS 1064](#))

Sexe

Tous

Âge

Aussi recommandé pour les enfants

Équivalence thérapeutique

Des médicaments appartenant à la même classe pharmacologique peuvent être utilisés

Limites de l'équivalence thérapeutique

Therapeutic alternatives to be reviewed (2023)

Limites d'équivalence thérapeutique pour l'EMLc

Therapeutic alternatives to be reviewed (2023)

Renseignements sur le brevet

Patents have expired in most jurisdictions

Lire la suite [sur les brevets.](#)

Wikipédia

[Bupivacaine](#)

DrugBank

[Bupivacaine](#)

Résumé des preuves et recommandation du comité d'experts



Following the review of the age-appropriateness of formulations on the EMLc, the Expert Committee recommended: - to remove specification of container type for bupivacaine injection. - to modify the formulation descriptions of bupivacaine injection for spinal anaesthesia to better describe the available dosage forms.