

## [Oxamniquine](#)

Statut de médicament essentiel

Section:

[6. Anti-infective medicines 6.1. Anthelmintics 6.1.3. Antischistosomes and other antitrematode medicines](#)

Codes ATC: [P02BA02](#)

EMLc

Indication

Schistosomiasis due to *Schistosoma mansoni* Code ICD11: [1G55.1](#)

INN

Oxamniquine

Type de médicament

Chemical agent

Type de liste

Liste complémentaire

Additional notes

oxamniquine is listed for use when praziquantel treatment fails.

Formulations

**Oral > Liquid:** 250 mg per 5 mL

**Oral > Solid > capsule:** 250 mg

Historique des statuts LME

Ajouté pour la première fois en 1977 ([TRS 615](#))

Modifié en 1979 ([TRS 641](#))

Modifié en 1997 ([TRS 882](#))

Modifié en 2005 ([TRS 933](#))

Modifié en 2007 ([TRS 950](#))

Sexe

Tous

Âge

Aussi recommandé pour les enfants

Équivalence thérapeutique

La recommandation concerne ce médicament spécifique

Renseignements sur le brevet

Patents have expired in most jurisdictions

Lire la suite [sur les brevets.](#)

Wikipédia

[Oxamniquine](#)

DrugBank

[Oxamniquine](#)

Résumé des preuves et recommandation du comité d'experts

Oxamniquine is recognized as second-line treatment for the treatment of schistosomiasis [praziquantel remains the first-line choice for all forms of schistosomiasis]. Noting that there are significant research gaps for medicines for children in this area, the EMLc Subcommittee decided to endorse this product as essential but highlighted the need for adequate studies to determine the effectiveness and safety of it in children.