

## [Meglumine antimoniate](#)

Statut de médicament essentiel

Section:

[6. Anti-infective medicines 6.5. Antiprotozoal medicines 6.5.2. Antileishmaniasis medicines](#)

Codes ATC: [P01CB01](#)

EMLc

Indication

Visceral leishmaniasis Code ICD11: [1F54.0](#)

Type de médicament

Chemical agent

Type de liste

Liste de base

Formulations

**Parenteral > General injections > IM:** 1.5 g per 5 mL in 5 mL ampoule

Historique des statuts LME

Ajouté pour la première fois en 1987 ([TRS 770](#))

Modifié en 1989 ([TRS 796](#))

Modifié en 2002 ([TRS 914](#))

Modifié en 2007 ([TRS 950](#))

Modifié en 2009 ([TRS 958](#))

Modifié en 2023 ([TRS 1049](#))

Sexe

Tous

Âge

Aussi recommandé pour les enfants

Équivalence thérapeutique

La recommandation concerne ce médicament spécifique

Renseignements sur le brevet

Patents have expired in most jurisdictions

Lire la suite [sur les brevets.](#)

Wikipédia

[Meglumine antimoniate](#)

DrugBank

[Meglumine antimoniate \(Pentavalent Antimony\)](#)

Résumé des preuves et recommandation du comité d'experts



Following the review of the age-appropriateness of formulations on the EMLc, the Expert Committee recommended the listing for sodium stibogluconate / meglumine antimoniate on the EML and EMLc be amended to list each medicine separately with updated dosage form descriptions as follows: Sodium stibogluconate: Injection: 100 mg/mL in 30 mL vial  
Meglumine antimoniate: Injection: 1.5 g/5 mL in 5 mL ampoule