

## [Pentamidine](#)

Not recommended as an essential medicine

Section:

[6. Anti-infective medicines](#) [6.5. Antiprotozoal medicines](#) [6.5.2. Antileishmaniasis medicines](#)

Codes ATC: [P01CX01](#)

EMLc

Indication

Visceral leishmaniasis Code ICD11: [1F54.0](#)

INN

Pentamidine

Type de médicament

Chemical agent

Type de liste

Liste complémentaire

Formulations

**Parenteral > General injections > IM:** 200 mg (as isetionate) ; 300 mg (as isetionate)

Historique des statuts LME

Ajouté pour la première fois en 1977 ([TRS 615](#))

Modifié en 1979 ([TRS 641](#))

Modifié en 1987 ([TRS 770](#))

Modifié en 1997 ([TRS 882](#))

Modifié en 2003 ([TRS 920](#))

Modifié en 2007 ([TRS 950](#))

Retiré en 2009 ([TRS 958](#))

Sexe

Tous

Âge

Aussi recommandé pour les enfants

Équivalence thérapeutique

La recommandation concerne ce médicament spécifique

Renseignements sur le brevet

Patents have expired in most jurisdictions

Lire la suite [sur les brevets.](#)

Wikipédia

[Pentamidine](#)

DrugBank

[Pentamidine](#)

Résumé des preuves et recommandation du comité d'experts

The EMLc Subcommittee had recommended the deletion of pentamidine for this indication as it was no longer used for visceral leishmaniasis in children. The Committee reviewed Section 6.5.2, medicines for leishmaniasis, for concordance between the EML and EMLc and, on the advice of the WHO Department of Control of Neglected Tropical Diseases (NTD), recommended pentamidine be also deleted from the EML.