

[Suramin sodium](#)

Statut de médicament essentiel

Section:

[6. Anti-infective medicines 6.5. Antiprotozoal medicines 6.5.5. Antitrypanosomal medicines 6.5.5.1. African trypanosomiasis 6.5.5.1.1. Medicines for the treatment of 1st stage African trypanosomiasis](#)

Codes ATC: [P01CX02](#)

EMLc

Indication

Rhodesiense trypanosomiasis Code ICD11: [1F51.1](#)

INN

Suramin sodium

Type de médicament

Chemical agent

Type de liste

Liste de base

Additional notes

To be used for the treatment of the initial phase of Trypanosoma brucei rhodesiense infection.

Formulations

Parenteral > General injections > IV: 1 g in vial

Historique des statuts LME

Ajouté pour la première fois en 1977 ([TRS 615](#))

Modifié en 1979 ([TRS 641](#))

Modifié en 2007 ([TRS 946](#))

Modifié en 2007 ([TRS 950](#))

Sexe

Tous

Âge

Aussi recommandé pour les enfants

Équivalence thérapeutique

La recommandation concerne ce médicament spécifique

Renseignements sur le brevet

Patents have expired in most jurisdictions

Lire la suite [sur les brevets](#).

Wikipédia

[Suramin sodium](#)

DrugBank

[Suramin sodium \(Suramin\)](#)

Résumé des preuves et recommandation du comité d'experts

The EMLc Subcommittee recommended that suramin sodium be endorsed for the EMLc for treatment of first-stage of Trypanosoma brucei rhodesiense infections. The Subcommittee noted that African trypanosomiasis is a major public health problem in affected countries. Medicines available for treating this infection are limited. Hence despite the toxicity profile, these medicines are still used. There is a paucity of documented information specific to children and recommendations for adults are usually followed.