

[Eflornithine](#)

Statut de médicament essentiel

Section:

[6. Anti-infective medicines 6.5. Antiprotozoal medicines 6.5.5. Antitrypanosomal medicines 6.5.5.1. African trypanosomiasis 6.5.5.1.2. Medicines for the treatment of 2nd stage African trypanosomiasis](#)

Codes ATC: [P01CX03](#)

EMLc

Indication

Gambiense trypanosomiasis Code ICD11: [1F51.0](#)

INN

Eflornithine

Type de médicament

Chemical agent

Type de liste

Liste de base

Additional notes

To be used for the treatment of Trypanosoma brucei gambiense infection.

Formulations

Parenteral > General injections > IV: 200 mg per mL in 50 mL bottle (hydrochloride)

Historique des statuts LME

Ajouté pour la première fois en 1991 ([TRS 825](#))

Modifié en 2007 ([TRS 946](#))

Modifié en 2007 ([TRS 950](#))

Modifié en 2023 ([TRS 1049](#))

Sexe

Tous

Âge

Aussi recommandé pour les enfants

Équivalence thérapeutique

La recommandation concerne ce médicament spécifique

Renseignements sur le brevet

Patents have expired in most jurisdictions

Lire la suite [sur les brevets](#).

Wikipédia

[Eflornithine](#)

DrugBank

[Eflornithine](#)

Résumé des preuves et recommandation du comité d'experts

Following the review of the age-appropriateness of formulations on the EMLc, the Expert Committee recommended the listing for eflornithine on the EML and EMLc be amended to change the bottle volume in which eflornithine is supplied from 100 mL to 50 mL.