

[Valproic acid \(sodium valproate\)](#)

Statut de médicament essentiel

Section:

[5. Medicines for neurological disorders](#) [5.1. Medicines for central nervous system disorders](#) [5.1.1. Antiseizure medicines](#)

Codes ATC: [N03AG01](#)

EMLc

Indication

Status epilepticus Code ICD11: [8A66](#)

INN

Valproic acid

Type de médicament

Chemical agent

Type de liste

Liste complémentaire

Additional notes

Avoid use in pregnancy and in women and girls of child-bearing potential, unless alternative treatments are ineffective or not tolerated because of the high risk of birth defects and developmental disorders in children exposed to valproate in the womb.

Formulations

Parenteral > General injections > IV: 100 mg per mL in 4 mL ampoule ; 100 mg per mL in 10 mL ampoule ; 100 mg per mL in 3 mL ampoule

Historique des statuts LME

Ajouté pour la première fois en 2015 ([TRS 994](#))

Modifié en 2021 ([TRS 1035](#))

Modifié en 2023 ([TRS 1049](#))

Sexe

Tous

Âge

Aussi recommandé pour les enfants

Équivalence thérapeutique

La recommandation concerne ce médicament spécifique

Renseignements sur le brevet

Patents have expired in most jurisdictions

Lire la suite [sur les brevets.](#)

Wikipédia

[Valproic acid \(sodium valproate\)](#)

DrugBank

[Valproic acid](#)

Résumé des preuves et recommandation du comité d'experts

Following the review of the age-appropriateness of formulations on the EMLc, the Expert Committee recommended the inclusion of an additional vial size of valproic acid injection (100 mg/mL in 3 mL) on the EML and EMLc.