

[Nevirapine](#)

Statut de médicament essentiel

Section:

[6. Anti-infective medicines 6.4. Antiviral medicines 6.4.2. Antiretrovirals 6.4.2.2. Antiretrovirals > Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors](#)

Codes ATC: [J05AG01](#)

EMLc

Indication

Human immunodeficiency virus disease without mention of associated disease or condition, clinical stage unspecified

Code ICD11: [1C62.Z](#)

INN

Nevirapine

Type de médicament

Chemical agent

Type de liste

Liste de base

Formulations

Oral > Liquid: 50 mg per 5 mL

Oral > Solid > dispersible tablet: 50 mg

Oral > Solid > tablet: 200 mg (EML)

Historique des statuts LME

Ajouté pour la première fois en 1999 ([TRS 895](#))

Modifié en 2002 ([TRS 914](#))

Modifié en 2007 ([TRS 950](#))

Modifié en 2015 ([TRS 994](#))

Modifié en 2023 ([TRS 1049](#))

Sexe

Tous

Âge

Aussi recommandé pour les enfants

Limite d'âge

> 6 weeks

Équivalence thérapeutique

La recommandation concerne ce médicament spécifique

Renseignements sur le brevet

Patents have expired in most jurisdictions

Lire la suite [sur les brevets.](#)

Wikipédia

[Nevirapine](#)

DrugBank

[Nevirapine](#)

Résumé des preuves et recommandation du comité d'experts

The Expert Committee recommended addition of nevirapine 50 mg dispersible tablet formulation to the core list of the EML and EMLc for the treatment of children and adolescents with HIV-1 infection. The Expert Committee agreed on the public health need for paediatric formulations of ART medicines and considered that the proposed formulation of nevirapine represented a rational treatment option for paediatric HIV patients. The Committee noted that this formulation is included in the 2013 WHO guidelines and are categorized by the IATT as an “optimal” paediatric formulation.